

S.v.p. veuillez remettre ce questionnaire à un collègue si vous ne prescrivez pas de lentilles cornéennes (LC). Merci.
Veuillez compléter les questions ci-dessous, puis noter les détails des dix premiers patients que vous adaptez en LC après avoir reçu ce questionnaire.

La date à laquelle vous avez reçu ce sondage	Dans quelle province travaillez-vous?	Depuis combien d'années :	Identifier votre type de pratique
		Pratiquez-vous ? Adaptez-vous des LC ?	<input type="checkbox"/> Indépendent (1-9 bureaux) <input type="checkbox"/> Régionale (10-49 bureaux) <input type="checkbox"/> National (50 ou plus bureaux)

Identifier une catégorie
uniquement

Identifier une catégorie uniquement

Identifier toutes les catégories qui s'appliquent

Identifier une catégorie uniquement

Identifier une
catégorie
uniquement

Identifier une
catégorie
uniquement

Renseignements généraux ¹					Lentilles cornéennes rigides/PAG			Lentilles souples ²			Design de lentille ³							Fréquence de remplacement					Port : # fois par semaine ⁴	Modalité ⁵		Système d'entretien											
Date	Px	Age	Sexe	Nouvelle Ajustement	Réajustement	Scérale	PMMA	PAG Dk<40	PAG Dk40-90	PAG Dk >90	Conventionnelle <40%	Conventionnelle 40-60	Conventionnelle >60%	Silicone hydrogel	Sphère	Torique	Multi focale	Mono vision	Teinte cosmétique	Orthokératologie standard	Control de la myopie	Autre		Journalier	1-2 semaines	1 mois	3-6 mois	12 mois	Non-planifié	Port quotidien	Port prolongé	Tout usage	Peroxyde	Autre	Aucun		
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					

Quelques précisions :

- Nouveaux ajustements et réajustement:** Un nouvel ajustement est un nouveau porteur (aucune expérience antécédente) OU il n'a pas porté de lentilles cornéennes (LC) depuis plusieurs années. Un réajustement est un porteur qui est réajusté à cause que leur profile de port a changé. Il essaie une nouvelle LC afin de résoudre leur problème.
- Lentilles souples.** Celles-ci sont divisés entre les lentilles en silicone hydrogel et les LC conventionnelles. Ces derniers sont divisés selon leur pourcentage de teneur en eau.
- Design de la lentille.** Identifier toutes les catégories qui s'appliquent. Orthokératologie standard : correction de la réfraction par orthokératologie. Control de la myopie : incluent l'ajustement de lentilles orthokératologie ou de lentilles souples spécialisées pour ralentir la progression de la myopie
- Nombre de fois par semaine les lentilles seront portées.** Si port quotidien, identifier le nombre de jours par semaine; si port prolongé, identifié le nombre de nuits/semaine les LC sont portées (maximum = 7 nuits).
- Modalité.** Les patients qui dorment avec leurs LC occasionnellement sont considérés comme des porteurs à port prolongé.

Une fois complété, SVP retournez cette fiche à Dr. Debbie Jones (School of Optometry, University of Waterloo, 200 University Ave W Waterloo, Ontario N2L3G1) dajones@uwaterloo.ca ou results@contactlensprescribing.com

Fax au : 519 340 6821 AVANT le 30 juillet 2025, même si vous n'avez pas complété les 10 patients