

Sondage sur la prescription de lentilles cornéennes en 2026

S.v.p. veuillez remettre ce questionnaire à un collègue si vous ne prescrivez pas de lentilles cornéennes (LC). Merci.

Veuillez compléter les questions ci-dessous, puis noter les détails des dix premiers patients que vous adaptez en LC après avoir reçu ce questionnaire.

La date à laquelle vous avez reçu ce sondage	Dans quelle province travaillez-vous?	Depuis combien d'années :	Identifier votre type de pratique
		Pratiquez-vous ? Adaptez-vous des LC ?	☐ Indépendent (1-9 bureaux) ☐ Régionale (10-49 bureaux) ☐ National (50 ou plus bureaux)

Renseignements généraux ¹						Lentilles cornéennes rigides/PAG					Lentilles souples ²				Design de lentille ³										Fréquence de remplacement					Port : # fois par semaine ⁴	Modalité ⁵		Système d'entretien			
Date	Px	Age	Sexe	Nouvelle Ajustement	Réajustement	Sclérale	PMMA	PAG Dk<40	PAG Dk40-90	PAG Dk>90	Conventionnelle <40%	Conventionnelle 40-60	Conventionnelle >60%	Silicone hydrogel	Sphère	Torique	Multi focale	Mono vision	Teinte cosmétique	Orthokératologie standard	Control de la myopie	Autre	Journalier	1-2 semaines	1 mois	3-6 mois	12 mois	Non-planifié	Port quotidien	Port prolongé	Tout usage	Peroxyde	Autre	Aucun		
	1																																			
	2																																			
	3																																			
	4																																			
	5																																			
	6																																			
	7																																			
	8																																			
	9																																			
	10																																			

Quelques précisions :

- Nouveaux ajustements et réajustement:** Un nouvel ajustement est un nouveau porteur (aucune expérience antécédente) OU il n'a pas porté de lentilles cornéennes (LC) depuis plusieurs années. Un réajustement est un porteur qui est réajusté à cause que leur profile de port a changé. Il essaie une nouvelle LC afin de résoudre leur problème.
- Lentilles souples.** Celles-ci sont divisés entre les lentilles en silicone hydrogel et les LC conventionnelles. Ces derniers sont divisés selon leur pourcentage de teneur en eau.
- Design de la lentille.** Identifier toutes les catégories qui s'appliquent. Orthokératologie standard : correction de la réfraction par orthokératologie. Control de la myopie : incluent l'ajustement de lentilles orthokératologie ou de lentilles souples spécialisées pour ralentir la progression de la myopie
- Nombre de fois par semaine les lentilles seront portées.** Si port quotidien, identifier le nombre de jours par semaine; si port prolongé, identifié le nombre de nuits/semaine les LC sont portées (maximum = 7 nuits).
- Modalité.** Les patients qui dorment avec leurs LC occasionnellement sont considérés comme des porteurs à port prolongé.

Une fois complété, SVP retournez cette fiche à Dr. Debbie Jones (School of Optometry, University of Waterloo, 200 University Ave W Waterloo, Ontario N2L3G1) dajones@uwaterloo.ca ou

results@contactlensprescribing.com

Fax au : 519 340 6821 AVANT le 30 juillet 2026, même si vous n'avez pas complété les 10 patients